


Harmonogram podawania leku CitraFleet® oraz płynów uzupełniających (napoje izotoniczne bez barwnika, jasne soki owocowe, klarowne, np. jabłkowy, winogronowy, precedzony wywar warzyny lub mięsny), 2 litry po każdej saaszetce (razem 4 litry).

Od momentu rozpoczęcia przygotowania do badania do czasu jego wykonania nie wolno spożywać pokarmów stałych!

Godz. _____


Wpisz godzinę wypicia I dawki leku CitraFleet®

Pamiętaj! Po wypiciu leku odczekaj koniecznie 10 - 30 minut nim zaczniesz pić płyny!



Odstęp między I i II
dawką leku **minimum
5 godzin**

2 litry




Na tym etapie **koniecznie** wypij **2 litry płynów** (np. jedn szklanka co 30 minut).
Odnaczk kolejną, wypitą dawkę płynu.

Godz. _____


Wpisz godzinę wypicia II dawki leku CitraFleet®

Pamiętaj! Po wypiciu leku odczekaj koniecznie 10 - 30 minut nim zaczniesz pić płyny!



Odstęp 2 godziny

2 litry



Na tym etapie **koniecznie** wypij **2 litry płynów** (np. jedna szklanka co 15 minut).
Odnaczk kolejną, wypitą dawkę płynu.

Pamiętaj! Odstęp pomiędzy II dawką leku a badaniem nie powinien być dłuższy niż 4 godziny.

Godz. _____

Wpisz godzinę wypicia ostatniej dawki płynu uzupełniającego

2 godziny

Odstęp między ostatnim wypitym płynem a badaniem:
minimum 2 godziny (zwłaszcza badanie ze znieczuleniem)

Data: _____ Godz. _____

Wpisz datę i godzinę badania kolonoskopowego

Najpierw wpisz godzinę badania kolonoskopowego, a następnie godziny przyjmowania kolejnych dawek leku CitraFleet® według schematu powyżej.

Przygotowanie do badania kolonoskopowego z wykorzystaniem preparatu CitraFleet®

Warunkiem dobrego przygotowania do badania kolonoskopowego jest dokładne oczyszczenie jelit. Uzyskuje się to poprzez odpowiednią dietę, w tym przede wszystkim picie płynów oraz przyjmowanie leku CitraFleet®, który wywołuje biegunkę (pod koniec treścią płynną). W trakcie przygotowania do badania należy zapewnić sobie stały i swobodny dostęp do toalety.

Zasady podstawowe:

- Ostatni posiłek ubogoresztkowy można spożyć rano w dzień poprzedzający badanie.
- W opakowaniu znajdują się dwie saszetki leku CitraFleet®. W trakcie przyjmowania leku (schemat poniżej) do każdej rozpuszczonej zawartości saszetki leku należy wypić dwa litry płynów (lista dopuszczalnych płynów znajduje się na drugiej stronie). Razem 4 litry (nie wliczając rozpuszczonego leku).
- Od momentu wypicia leku nie wolno już nic jeść! Należy jedynie pić wskazane płyny.
- Przygotowanie roztworu: wsypać zawartość jednej saszetki do filiżanki zimnej wody (około 150ml). Powstała zawiesina będzie mętna. Następnie należy mieszać przez 2-3 minuty do uzyskania jednolitego roztworu. Zawartość naczynia rozgrzeje się podczas mieszania, przed wypiciem należy odczekać do momentu jej ochłodzenia.
- Po wypiciu roztworu należy **koniecznie odczekać 10-30 minut** i rozpocząć picie płynów po każdej saszetce (2 litry na jedną saszetkę leku, np. 8 szklanek po 250 ml).
- Należy zachować co najmniej 5-godzinny odstęp pomiędzy zastosowaniem pierwszej i drugiej saszetki leku CitraFleet®.

Uwagi ośrodka:

Uwaga: niestosowanie się do zaleceń dotyczących diety oraz picia płynów może skutkować nieodpowiednim oczyszczeniem jelita i koniecznością powtórzenia badania.