

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA NA SEDACJĘ/ZNIECZULENIE OGÓLNE DOŻYLNIE DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Metody znieczulenia

W celu wykonania badania endoskopowego stosuje się różne formy znieczulenia.

- **Znieczulenie miejscowe**

Błonę śluzową jamy ustnej, języka i gardła znieczula się roztworem 2% lidokainy (leku znieczulającego miejscowo)

Po znieczuleniu jamy ustnej, języka i gardła, co objawia się uczuciem zdrętwienia, zeszywnienia i utraty czucia oraz utrudnionym połykaniem śliny. Znieczulenie miejscowe może powodować:

gorzki smak w ustach

odruchy wymiotne przy znieczuleniu gardła

zdrętwienie jamy ustnej i gardła

Znieczulenie miejscowe i jego objawy (zdrętwienie, utrudnienie połykania) ustępują w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu minut po zakończeniu badania. Pacjenci proszeni są o nieprzyjmowanie pokarmów stałych i płynnych przez 2 godziny od zakończenia badania.

Przed podaniem posiłku lub napoju najlepiej jest przeprowadzić wstępną próbę polegającą na podaniu niewielkiej ilości wody do picia. Jeśli nie ma uchwytynych trudności w przełykaniu i nie występuje krztuszenie się, można podać inne płyny i pokarmy.

- **Sedacja**

Prawie wszystkie zabiegi endoskopowe wykonuje się współcześnie w tym znieczuleniu, zwanym również „płytką sedacją” dla odróżnienia od znieczulenia ogólnego. Chory otrzymuje krótko działający lek uspokajający oraz silny lek przeciwbólowy. Po podaniu leków, w czasie zabiegu pacjent nie zasypia, sam oddycha, uspokaja się i przez to sam zabieg dla chorego jest mniej nieprzyjemny.

O doborze leku i sposobie jego podania decyduje lekarz anestezjolog, który w zakresie ich stosowania ma doświadczenie, zna dokładnie ich właściwości, zastosowanie, dawkowanie oraz działania niepożądane.

- **Znieczulenie ogólne dożylnie**

Jest to znieczulenie porównywalne ze znieczuleniem prowadzonym przy operacjach. Polega ono na podaniu leków uspokajających, przeciwbólowych i nasennych drogą dożylną. Pacjent nie odczuwa bólu a świadomość jest okresowa lub całkowicie zniesiona. W trakcie znieczulenia monitorowane są czynności życiowe oraz podawany jest tlen. Budzenie chorego następuje po zakończeniu badania i zwykle trwa kilka lub kilkanaście minut w zależności od stosowanego leku. **Większość leków eliminowana jest z organizmu przez długi czas, więc pacjent po znieczuleniu nie może pozostawać sam przez 24 godziny, ani nie może prowadzić samochodu i innych pojazdów.** Przez 2 godziny po znieczuleniu należy powstrzymać się od jedzenia i picia.

W przypadku badania wykonywanego w trybie jednodniowej hospitalizacji konieczna jest opieka osoby towarzyszącej po badaniu i w drodze do domu, niezależnie od wieku badanego.

Możliwe do przewidzenia powikłania znieczulenia

Znieczulenie może wiązać się z występowaniem powikłań. Większość z nich ma charakter lekkich i przemijających dolegliwości, nie powodujących trwałych następstw dla pacjenta.

Do najczęściej występujących powikłań znieczulenia ogólnego zalicza się:

- ból gardła, nasilający się przy przełykaniu
- uczucie braku powietrza i przejściowe trudności w oddychaniu bezpośrednio po wybudzeniu
- nudności i wymioty
- uszkodzenie zębów, warg, języka
- nietypowe reakcje na leki anestezjologiczne

Do ciężkich, bardzo rzadko występujących powikłań zalicza się:

- niedotlenienie organizmu związane z trudnościami w wentylacji
- aspiracja treści pokarmowej do płuc i w następstwie ciężka niewydolność oddechowa

UWAGA! Przed wykonaniem znieczulenia niezbędne jest powstrzymanie się od spożycia jakichkolwiek posiłków i płynów przez minimum **6-8 godzin** (nie dotyczy niewielkiej ilości wody – 1-2 łyżki np. do popicia leków). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wystąpienie bardzo groźnych dla życia następstw ze śmiertelnym włącznie z powodu zachłyśnięcia i aspiracji treści pokarmowej do płuc.

Przed udaniem się na sale operacyjną należy również zdjąć wszelką biżuterię oraz wyjąć protezy zębowe oraz zmyć lakier na paznokciach.

Zapoznałem/łam się z przedstawionymi informacjami i po rozmowie z lekarzem anestezjologiem i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania zgadzam się na proponowane znieczulenie oraz na uzasadnione zmiany postępowania anestezjologicznego, w tym zmianę rodzaju znieczulenia.

Wyrażam zgodę na wykonanie u mnie znieczulenia:

- ☐ **znieczulenie ogólne dożylnie**
- ☐ **analgesedacja**

Data

Podpis Pacjenta

Podpis anestezjologa

.....

.....